

# PEMBROLIZUMAB

**Kan enkele ernstige bijwerkingen veroorzaken. U kunt last krijgen van meer dan één bijwerking tegelijkertijd.**

Als u een van de volgende tekenen of verschijnselen heeft, of anderen die niet genoemd zijn op deze kaart, moet u onmiddellijk uw arts bellen of bezoeken. Uw arts zal u mogelijk andere geneesmiddelen geven om ernstige complicaties te voorkomen en de verschijnselen te verminderen. Uw arts kan ook de volgende dosering van pembrolizumab uitstellen of de behandeling met pembrolizumab stoppen.

Voor meer informatie: lees de patiëntenbijsluiter op de website [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)

Plakvlak achterkant

## TEKENEN OF VERSCIJNSELEN VAN BIJWERKINGEN

### Longen

- Kortademigheid
- Pijn op de borst
- Hoesten

### Darmen

- Diarree of vaker ontlasting dan gebruikelijk
- Zwarte, teerachtige, plakkerige ontlasting met bloed of slijm
- Ernstige maagpijn of gevoeligheid van de maag
- Misselijkheid of braken

### Lever

- Misselijkheid of braken
- Minder honger hebben
- Pijn aan de rechterzijde van de maag
- Geel worden van de huid of het oogwit
- Donkere urine
- Sneller dan normaal optreden van bloedingen of blauwe plekken

### Nieren

- Veranderingen in de hoeveelheid of de kleur van de urine

### Hormoonklieren

- Snelle hartslag
- Gewichtsverlies of gewichtstoename
- Meer zweten
- Haaruitval
- Koud gevoel
- Verstopping
- Zwaardere stem
- Spierpijn
- Duizeligheid of flauwvallen
- Hoofdpijn die niet overgaat of ongewone hoofdpijn

### Diabetes type 1

- Meer honger of dorst hebben dan normaal
- Vaker moeten plassen
- Gewichtsverlies

### Huid

- Huiduitslag
- Jeuk
- Blaarvorming op de huid

- Huidafschilfering of huidzweren
- Zweren in de mond of in het slijmvlies van de neus, keel of geslachtsdelen

### Andere organen

- Ogen: veranderingen in het gezichtsvermogen
- Spieren: spierpijn of spierzwakte
- Hart: kortademigheid, onregelmatige hartslag, moeheid of pijn op de borst
- Alveesklier: buikpijn, misselijkheid en braken
- Zenuwen: een tijdelijke ontsteking die pijn, zwakte en verlamming in de armen en benen veroorzaakt
- Afstoting van een orgaantransplantaat na het krijgen van pembrolizumab (vertel het uw arts als u een orgaantransplantatie heeft ondergaan)
- Een immuunziekte die de longen, huid, ogen en/of lymfeklieren kan aantasten
- Hersenen: ontsteking die verwardheid, koorts, problemen met het geheugen of toevallen kan veroorzaken

### Infusiereacties

- Kortademigheid
- Jeuk of huiduitslag
- Duizeligheid
- Koorts

### Complicaties bij mensen die een beenmerg (stamcel) transplantatie hebben gehad waarbij donor (allogene) stamcellen zijn gebruikt

- Huiduitslag
- Leverontsteking
- Buikpijn
- Diarree

Plakvlak voorkant

## BELANGRIJK

- Probeer niet zelf bijwerkingen te behandelen zonder advies van uw arts.
- Neem deze kaart altijd mee, vooral als u op reis gaat, als u naar de spoedeisende hulp moet of als u naar een andere arts dan uw behandelend arts moet.
- Zorg ervoor dat u deze kaart laat zien aan elke zorgverlener waar u naartoe gaat, zodat zij weten dat u wordt behandeld met pembrolizumab.

## BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS

Deze patiënt wordt behandeld met pembrolizumab, dat immuungerelateerde bijwerkingen kan veroorzaken die de longen, darmen, lever, nieren, hormoonklieren, huid en andere organen betreffen, alsmede infusiegerelateerde reacties. Tijdige diagnose en geschikte behandeling zijn essentieel om elk gevolg van immuungerelateerde bijwerkingen te beperken. Zie de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) van pembrolizumab voor verdere informatie en behandeladviezen.

Overleg met een oncoloog of een andere medisch specialist kan zinvol zijn bij de behandeling van orgaan-specifieke immuungerelateerde bijwerkingen. Controleer patiënten op tekenen en verschijnselen van pneumonitis, colitis, hepatitis, nefritis, endocrinopathieën (inclusief hypofysitis, diabetes mellitus type 1 (waaronder

diabetische ketoacidose), hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie) en bijwerkingen op de huid, waaronder Stevens-Johnsonsyndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN).

Andere immuungerelateerde bijwerkingen gezien met pembrolizumab zijn: uveïtis, artritis, myositis, myocarditis, pancreatitis, syndroom van Guillain-Barré, afstoting van een orgaantransplantaat na behandeling met pembrolizumab bij ontvangers van een donororgaan, myasthenisch syndroom, hemolytische anemie, sarcoïdose, encefalitis en daarnaast ook complicaties van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Aanvullende informatie over pembrolizumab is beschikbaar in de bijsluiter op de website [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) of bel de medische informatie afdeling van MSD BV op tel.: 0800 9999000 voor meer informatie.

## BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

**Naam van de arts**

---

**Telefoonnummer praktijk**

---

**Telefoonnummer na sluitingstijd**

---

**Mijn naam**

---

**Mijn telefoonnummer**

---

**CONTACT IN NOODSITUATIES**

**Naam**

---

**Telefoonnummer**

---

▼ Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel verkrijgen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel. Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product:

Merck Sharp & Dohme B.V.  
tel.: 0800 9999000  
(+31 23 5153153)  
[medicalinfo.nl@merck.com](mailto:medicalinfo.nl@merck.com)

